

С.Ф.Ужевская

КЛЕЩИ СЕМ. Tarsonemidae — ОБИТАТЕЛИ
ГАЗОННЫХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА

Одесский университет

Для обследования взяты образцы 12 видов злаков с газонов г.Одессы и 8 г. Ашхабада (октябрь 1984г.). Злаки определены Е.Н.Поповой. Полученные данные сравниваются с данными для Варшавы и Мазовии (Niedballa et est, 1982). На газонах Одессы отмечено 19 видов клещей рода Tarsonemus: T.annotatus, T.aequalis, T.bilobatus, T.con-

fusus, *T. caudatus*, *T. fusarii*, *T. infractus*, *T. lacustris*, *T. myceliophagus*, *T. margaretae*, *T. mublei*, *T. pennisetus*, *T. pseudolacustris*, *T. parafusarii*, *T. talpae*, *T. waitei*, *T. vestitus*, *T. volgini*, *T. virgineus* и 7 - рода *Steneotarsonemus*: *St. acuticlavus*, *St. arcuatus*, *St. crassisetis*, *St. casteli*, *St. panshini*, *St. phragmitidis*, *St. varicosus*. На злаках газонов Ашхабада всего найдено пять видов тарсо-
немид *Tarsonemus fusarii*, *T. parafusarii*, *T. sharonovi* sp.n., *Steneo-
tarsonemus konoi* (впервые для фауны СССР) *St. varicosus*. Общи-
ми для фаун трех городов, расположенных в разных зонах является
один вид, для Ашхабада и Одессы - два, Одессы и Варшавы - 10 видов
клещей. На злаках, встречающихся в Одессе и Ашхабаде, щетинниках си-
зом и зеленом, свинорое пальчатом отмечена высшая заселенность
клещами рода *Steneotarsonemus* (от 2 до 10 экз. на 1 г сух.веса).
В Ашхабаде в засушливых местах на *Hordeum turkestanicum* тарсо-
немиды не найдены, а на орошаемых участках на *Cyperus longus* встре-
чается только *T. parafusarii*, как в городе, так и на хлопковых по-
лях.