

БЕЛОАКАЦИЕВАЯ ПАРЕКТОПА НА *ROBINIA PSEUDOACACIA* L. В ОДЕССЕ

¹ Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, ул. Дворянская, 2, г. Одесса, 65026, Украина, (048) 723-52-54, (048) 723-35-15, e-mail: grass_snake@ukr.net

² Опытная станция карантина винограда и плодовых культур института защиты растений УААН, Фонтанская дор., д.49, г. Одесса, 65009, Украина, (0482)63-17-04, (0482)68-60-61, e-mail: liliana.myzyka@gmail.com

Robinia pseudoacacia L. (белая акация) широко используется в озеленении южных территорий Украины с начала XIX столетия и стала визитной карточкой г. Одессы. Засухоустойчивый вид, с крепкой древесиной оказался устойчивым ко многим местным фитофагам. Отмечалось незначительное количество видов, повреждающих акацию. Однако в середине XX века в Европу и Азию было завезены виды, которые стали заметными вредителями (*Obolodiplosis robinie* Haldeman и *Parectopa robinella* Clemens).

По данным Ю.И. Гниненко и А.Г. Ракова (2011) *Parectopa robinella* Clemens, 1859 (Gracillariidae) – белоакациевая паректопа (белоакациевая моль-пестрянка, белоакациевая верхнеесторонняя моль) в 1970 г обнаружена в Италии, завезена из восточных штатов США. По территории стран Центральной Европы распространяется в направлении запад-восток со скоростью около 35 км в год, а в направлении юг-север – 30 км/год. В 2003 году вид был зарегистрирован в г. Киеве, широко распространился на территории России.

В г. Одессе первые единичные случаи поражения *R. pseudoacacia* личинками белоакациевой паректопы нами были зарегистрированы в 2008 году на территории городского парка имени Т.Г. Шевченко. В 2011 году при обследовании *R. pseudoacacia* в крупных парках города (Победы, Дюковском, имени Т.Г. Шевченко) поражения *R. pseudoacacia* паректопой не регистрировались.

В 2012 году отмечены очаги в северных районах города: Лесках, Лузановке, Слободке. От парка имени Т.Г. Шевченко до Аркадии по трассе здоровья зарегистрированы отдельные очаги белоакациевой паректопы. Максимальная численность мин отмечена в начале июля 2012 г в Лесках (60% листьев имели 1 – 4 минны на сложный лист). Встречаются отдельные очаги на *R. pseudoacacia* по правому берегу Тилигульского лимана (пгт. Коминтерново, с. Кордон, с. Любополь).

Можно предположить, что белоакациевая паректопа (аналогично каштановой моли) в ближайшие годы будет активно колонизировать *R. pseudoacacia* на всей территории г. Одессы и распространится в южные районы.